

Состав и форма выпуска

Капсулы, 10 штук в упаковке.

1 капсула содержит:

Стабилизатор: микрокристаллическая целлюлоза.

Оболочка капсулы: гидроксипропилметилцеллюлоза; сахароза; L-аскорбиновая кислота (витамин С); рисовый крахмал.

Покрывающий агент: шеллак. Стабилизатор: гидроксипропилцеллюлоза; экстракт белка почек свиньи (0,1% диаминоксидаза).

Наполнитель: поливинилпирролидон.

Разделительный агент: тальк; модифицированный крахмал.

Загуститель: карбоксиметилцеллюлоза натрия.

Увлажнитель: глицерин.

Фармакологическое действие

Даосин фермент содержит diaminooxidase (DAO), который отвечает за деградацию гистамина и заменяет его отсутствие активности в организме. Используйте капсулы непосредственно перед питанием вызывает повышенный уровень фермента DAO в тонкой кишке и гистамин рациона, то тело более разложившейся. Гистамин затем всасывается из тонкого кишечника и не вызывает проблемы для людей с ограниченной переносимостью гистамина.

Капсулы Даосин удерживают фермент диаминоксидаза в организме при деградации гистамина и таким образом оберегают от последствий непереносимости гистамина.

Показания к применению

Daosin назначается при непереносимости организмом гистамина.

Способ применения

Больные, страдающие недостатком или непереносимостью гистамина, употребляют по штуке трижды в сутки за 15 минут до приёма пищи. Запивать маленьким количеством воды.

Если человек не может проглотить капсулу, нужно высыпать содержимое в воду (1 капсула на 100 мл воды) и выпить. Подойдет пациентам с непереносимостью, поскольку не содержит никаких вредных добавок.

Не превышать дозировку Daosin Stada (3 капсулы в сутки).

Капсулы Даосин не используются как продукт питания и не выступают в качестве замены сбалансированного рациона и здорового образа жизни. Совместное принятие с некоторыми фармацевтическими веществами и спиртосодержащими напитками уменьшает активность действующего вещества в несколько раз. Используется только по назначению и под контролем доктора.

Противопоказания

Запрещено применять капсулы Даосин детям, а также людям, имеющим индивидуальную невосприимчивость к составляющим препарата. Запрещено употреблять детям до 14 лет.

Побочные действия

Препарат не вызывает явных побочных действий. Но были отмечены случаи аллергии на составляющие капсул, проблемы при проглатывании средства. Редко мигрень, головокружение и обмороки. Иногда рвота, тошнота и болевые ощущения в области живота. Очень редко проблемы с сердечно-сосудистой системой, тахикардия, боли в области груди.

Условия хранения

Препарат содержится в сухом, прохладном месте, недоступном для детей.

Условия хранения

При температуре не выше 25 С.

Категория отпуска

По рецепту.